從卷五寒門

一 咳嗽 附 二十 肺痿 二十二 肺癰

二十三 霍乱

至卷六暑門

一 瘧 灸法

十六 二 痢

Dr. Saiki's Library.

京都產院文庫藏書

架號 函或之番號	
冊之番號	4435
備考	

丹溪心法附餘卷之五　丙集

[illegible]寒門

咳嗽 十三六　附肺痿 肺癰

丹溪心法

○咳嗽有風寒　痰飲　火鬱　勞嗽　肺脹　春作是春升之氣用清涼藥二陳加薄荊之類　夏是火氣炎上最重用芩連　秋是濕熱傷肺　冬是風寒外來以藥發散之後用半夏逐痰必不再來　風寒行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁　逐痰飲降痰隨証加藥　火主清金化痰降火　勞嗽四物湯加竹瀝薑汁補陰為主　乾咳嗽難治此係火鬱之証乃痰鬱其火邪在中用苦梗開之下用補陰降火之劑四物加炒

栢竹瀝之類不已則成勞此不得志者有之倒倉法好　肺虛嗽甚此好色腎虛者有之用參膏以陳皮生薑佐之大槩有痰加痰藥　上半日多嗽者此屬胃中有火用貝母石膏降胃火　午後嗽多者屬陰虛必用四物湯加炒栢知母降火　黃昏嗽者是火氣浮於肺不宜用凉藥宜五味子五倍子斂而降之　五更嗽多者此屬胃中有食積至此時火氣流入肺以知母地骨皮降肺火　肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火踈肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝薑汁之類　嗽而脇下痛宜踈肝氣以青皮挾痰藥實者白芥子之類住後以二陳湯加南星香附子青黛青皮薑汁　血碍氣作嗽者桃仁去皮尖大黃酒炒薑汁丸服　治

嗽多用生薑以其辛散故也　痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽　治嗽多用粟殼不必疑但用先去病根此乃收後藥也治痢亦同　勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石薑便浸附瓜蔞青黛杏仁半夏麴之類薑蜜調噙化必以補陰為主　治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在三柱骨下兩膀各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之　有嗽而肺脹壅遏不得眠者難治　肺痿專主養肺氣養血清金　嗽而肺氣有餘者宜瀉之桑白皮為主半夏茯苓佐之瀉其有餘補其不足　肺燥

者當潤之屬熱者桔梗大力知母雞清　聲啞者屬寒宜細辛
半夏生薑辛以散之肺虛者人參膏阿膠為主陰不足者六味
地黃丸為要藥或知母茯苓湯為妙　陰虛氣喘四物湯加陳
皮甘草些小以降其氣補其陰白芍藥須用酒浸晒乾　濕痰
帶風喘嗽者不可一味苦寒折之如千緡湯墜痰丸更以皂角
蘿蔔子杏仁百藥煎薑汁丸噙化　濕痰帶風以千緡湯墜痰
丸固捷　痰積嗽非青黛瓜蔞不除有食積人面青白黃色不
常面上有如蟹爪路一黃一白者是　欬逆嗽非蛤粉青黛瓜
蔞貝母不除　口燥咽乾有痰者不用半夏南星用瓜蔞貝母
飲水者不用瓜蔞恐泥膈不鬆快　知母止嗽清肺滋陰降火
杏仁瀉肺氣氣虛久嗽者一二服劫止　治酒嗽青黛瓜蔞

蜜丸噙救肺　食積痰作嗽發熱者半夏南星為君瓜蔞蘿蔔子為臣青黛石鹼為使

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大槩耳亦當明其是否也

入方

杏仁去皮尖　蘿蔔子各半兩

右為末粥丸服

清化丸　治肺鬱痰喘嗽睡不安寧

貝母　杏仁　青黛

右為末沙糖入薑汁泡蒸餅丸如彈子大噙化

治久嗽風入肺

鵝管石　雄黄　欝金　款花

右為末和艾中以生薑一片安舌上灸之以烟入喉中為度

治飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就吞瓜蔞杏連丸

治嗽款劫藥

五味子五錢　甘草二錢半　五倍子　風化硝各一錢

右為末蜜丸噙化又云乾噙

治欬嗽聲嘶者此血虛火多

青黛　蛤粉

右為末蜜調噙化

治嗽喘去湿痰

白术　半夏　蒼术　香附各一兩

貝母　杏仁去皮尖炒　黃芩各半兩

右為末薑汁打糊丸

治婦人形瘦有時夜熱痰嗽月經不調

青黛　瓜蔞仁　香附童便浸曬乾

右為末薑蜜調噙化

治一人風熱痰嗽

南星　海粉各二兩　半夏一兩　青黛

黃連　瓜蔞子　石鹼　蘿蔔子各半兩

防風　皂角炭各三錢

右為末神麯糊丸服

治勞嗽吐紅

人參　白术　茯苓　百合

紅花　細辛　五味　官桂

阿膠　黄芪　半夏　杏仁

甘草　白芍　天門冬

右剉水煎若熱去桂芪用桑白皮麻黄不去節杏仁不去皮

同煎

又方　治嗽血

紅花　杏仁去皮尖　枇杷葉去毛　紫菀茸

鹿茸炙　木通　桑白皮　又云加大黄

右為末煉蜜丸噙化

嗽烟筒　治痰嗽久遠者

佛耳草　欵花二錢　鵝管石　雄黄半錢

右為末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽劫藥

訶子　百藥煎　荆芥穗

右為末薑蜜丸噙化

又方　治心煩欬嗽等証

六一散加辰砂服

青金丸　治食積火鬱嗽劫藥

貝母　知母各半两為末　巴豆去油[illegible]半錢

右為末薑泥丸辰砂為衣食後服每五丸白湯下 一云青黛

為衣

青金丸 一名與點丸與清化丸同用瀉肺火降膈上熱痰

片子黄芩 炒

右為末糊丸或蒸餅丸梧桐子大每服五十丸

青化丸 與青金丸同用專治熱嗽及咽痛故苦能燥熱濕輕

能治上

燈籠草 炒

右為末蒸餅丸 又細末醋調敷咽喉間痛

又方 治痰嗽

礞石半两煅 風化硝二錢半 半夏二兩 白朮一兩

茯苓　陳皮各二錢半　黄芩半两

右為末粥丸

又方　治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之

粟殼四两蜜炒去蒂膜　烏梅一两　人參半两

款花半两　桔梗半两　兠鈴一两　南星薑製半两

右為末蜜丸彈子大含化

蒼沙丸　調中散鬱

蒼朮　香附子各四两　黄芩二两

右為末蒸餅丸梧桐子大每服五十丸食後薑湯下

人參清肺散　治痰嗽咽乾聲不出

人參一錢半　陳皮一錢半　半夏一錢　桔梗一錢

麥門冬半錢　五味子一箇　茯苓一錢　甘草半錢
桑白皮一錢　知母一錢　地骨皮半錢　枳殼一錢
貝母一錢半　杏仁一錢　款花七分　黃連一錢
右水煎生薑三片

四物湯　見補損

六味地黄丸　見補損

知母茯苓湯　見肺痿

千緡湯

墜痰丸

二陳湯　俱見痰類

附脈理

脉訣舉要曰欬嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞濇難右関濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當欬嗽五臓之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑多痰弦濇少血形盛脉細不足以息沉小伏匿皆是死脉惟有浮大而嗽者生外証内脉參考稱停

附諸方

華蓋散 和劑方 治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩悶頭目昏眩

紫蘇子炒 赤茯苓去皮 陳皮去白 桑白皮

杏仁去皮尖炒 麻黄去根節各一两 甘草炙半两

右為末每服二錢水一盞煎七分食後温服

敗毒散 治傷寒發熱咳嗽頭疼

參蘇飲　治上膈有熱咳嗽聲重

金沸草散　治感冒寒邪鼻塞聲重咳嗽不已　並見傷風

小青龍湯　和劑方　治感寒咳嗽喘息不得睡卧及治傷寒表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽氣喘　見濕熱

五拗湯　澹寮方　治風寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去節　杏仁不去皮　甘草生用　荊芥穗

桔梗各等分

右㕮咀生薑三片同煎溫服咽痛甚者煎熟後加朴硝少許

一方去桔梗荊芥用半夏枳實等分

加味理中湯　仁齋直指　治肺胃俱寒咳嗽不已

甘草炙　半夏湯洗　茯苓去皮　乾薑不炒

白朮　橘紅　細辛　北五味

人參 各等分

右㕮咀每服三錢薑棗煎食前服

易簡杏子湯 拔粹方 治咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲停

積悉治

人參 去芦　半夏 湯泡　茯苓 去皮　甘草 炙

芍藥　五味子 各一两　細辛　乾薑

官桂 各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚薑五片烏

梅一箇煎至七分去滓服　若新感冒加麻黃等分

橘蘇湯 濟生方 治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱服杏

子湯不得者

紫蘇葉　杏仁去皮各一两　甘草炙半两　白术

橘紅　半夏洗七次　桑白皮炒　貝母去心

五味子各一两

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎七分温服不拘時

紫蘇飲子拔粹方治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉　桑白皮　青皮去白　五味子

杏仁　麻黄　甘草　陳皮各五錢

人參　半夏湯泡各二錢

右㕮咀每服一两生薑三片水二盞煎八分食後温服

人參荊芥散濟生方治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不

出咽乾項強鼻流清涕

陳皮去白　荊芥穗　桔梗　半夏湯泡七次

細辛洗去土　甘草炙　人參　杏仁去皮尖

通草　麻黄

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分食後溫服

人參潤肺湯聖惠方治肺氣不足喘咳不已并傷寒壯熱頭[illegible]

身痛

人參　乾葛　桔梗　白芷

麻黄去節　乾薑五錢　白朮　甘草炙各一兩

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片葱白一莖煎至八分

溫服

橘皮湯 聖惠方 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中有聲上氣頭痛

陳皮　紫菀　麻黃去根　杏仁炒

當歸　官桂　甘草　黃芩各等分

右㕮咀每服一两水二盞煎八分去滓溫服食後

蠟煎散 御藥院方 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花　茶花　甘草炙各七錢半　五味子半两

桑白皮炒　桔梗　杏仁　紫蘇葉各一两

右㕮咀每服四錢水二盞入黃蠟少許同煎臨卧服

柯子散　咳嗽聲音不出

柯子三錢去核半煨半生　甘草二錢半炒半生

木通三錢　桔梗五錢半炒半生

右每服水一盞半煎至八分入生地黄汁一小盞攪匀臨卧徐徐嚥

四聖散聖惠方治咳嗽有失聲音

晋鹽　葛根　槐花子　山梔子等分

右㕮咀水二盞加烏梅甘草少許煎一盞入蜜少許食後通口服

八味欵冬花散御藥院方治肺經寒熱不調涎嗽不已

欵冬花洗焙紫菀茸　五味子　甘草炙各七錢半

桑白皮　麻黄去節　杏仁湯泡去皮炒紫蘇葉各一兩

右為粗末每服五錢水一盞半入黄蠟皂角子大煎至一盞熱服

已上數方治感冒風寒新咳嗽之劑

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急方見[illegible]

杏參散 治胸脇脹滿上氣喘急咳嗽不得睡卧

桃仁去皮炒 人參 桑白皮蜜炙米泔浸[illegible]

杏仁去皮炒各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑棗煎不拘時

蘇沉九寶湯簡易方 治老幼素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽哮吼夜不得睡

桑白皮 甘草 大腹皮 官桂

麻黄 薄荷 陳皮 紫蘇

杏仁各六分

右㕮咀每服三錢水盞半薑三片烏梅半箇煎六分服

平肺散簡易方治肺氣上壅喘咳痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮一兩　半夏洗七次　苦梗炒　薄荷各七錢半

紫蘇　烏梅去核　紫菀　知母

桑白皮蜜炒　杏仁炒　五味子各一錢半

甘草半兩　罌粟殻蜜炒七錢半

右㕮咀每服五錢水一盞薑三片煎六分食後温服

瀉白散濟生方治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗去芦炒　地骨皮去木　甘草炙　瓜蔞子

升麻　半夏湯泡七次　杏仁去皮尖　桑白皮炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分食前温服

加減瀉白散拔粹方治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮一两 地骨皮七錢 甘草 陳皮去白

青皮 五味子 人參各五錢 白茯苓三錢

右㕮咀每服一兩水二盞加粳米煎至一盞食前温服

青龍散 御藥院方 治咳嗽上氣不得卧

人參去芦 陳皮去白 五味子 紫蘇各一兩

右㕮咀每服一兩水二盞生薑五片煎至八分去滓食後温服

加減三奇湯 拔粹方 治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗五錢去芦 半夏洗七次 陳皮去白 甘草

青皮去白各半兩 杏仁三錢 五味子四錢

人參 桑白皮 蘇葉各五錢

右㕮咀每服八錢薑三片水二盞煎至八分去滓通口服食後

人參潤肺散 直指方 治嗽喘急痰涎壅塞

麻黃去根節二兩　杏仁去尖炒一兩半

桔梗半兩　人參去芦二兩　阿膠炒半兩　甘草炙一兩

橘紅二錢半　貝母去心炒一兩半

右㕮咀每服八錢水一盞半紫蘇三葉煎至八分去滓溫服食後

杏仁煎丸 瑞竹堂方 治老人久患肺喘咳嗽不已睡臥不安服之立効

杏仁去皮尖　胡桃肉湯泡去皮各

右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如彈子大每服一二丸食後臨卧細嚼薑湯送下

紫蘇半夏湯 拔粹方 治喘嗽痰涎寒熱往來

桑白皮二兩半　陳皮去白　五味子各五錢　紫菀茸五錢

杏仁去皮尖一兩炒　半夏湯泡七次　紫蘇各五錢

右為粗末每服五錢生薑三片煎日進三服

清金湯聖惠方治男婦遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸膈滿氣逆坐臥不安飲食不下

粟殼蜜炒半兩　甘草炙五錢　陳皮去白　茯苓去皮

杏仁去皮尖炒　阿膠炒　五味子　桑白皮炒

薏苡仁　紫蘇　貝母去心　半夏麯

加百合　款冬花各一兩　人參五錢

右㕮咀每服八錢水一盞半生薑三片烏梅一箇煎至八分食後服

潤肺膏　治咳嗽痰喘

紫菀　杏仁去皮尖　款冬花各一两　麻黄

桔梗　細辛　訶子各五錢　枯礬一錢

生薑三两取汁　清油半斤　蜜一斤　核桃肉一两

右先將油煉香熟次入蜜又煉去沫却下末藥攪勻每服一

三匙臨卧白湯調服

奪命丹　上氣喘急經歲咳嗽齁鮯久不愈

信石一錢　白礬二錢　白附子三錢　南星四錢

半夏五錢洗

右先用信石與白礬一處於石器內火煅紅出火黃色爲度

切不可犯鐵器却和半夏南星白附子爲細末生薑汁麪糊

為丸如黍米大硃砂為衣每服七丸小兒三丸井花水吞下
忌食諸惡毒熱物

○廣按此方治咳嗽痰喘劫劑也盖肺受火邪氣從火化有升無降加以脾濕生痰則上壅而為喘嗽滿悶不得安卧矣病作之時固宜用此藥以劫痰然病安之後即當用知母茯苓湯或人參五味子散寧肺湯以補虛可也

一方　治咳嗽痰喘

南星炮　半夏湯泡各一兩　甘草三錢炙　陳皮去白一兩半
杏仁五錢去皮尖　款冬花二錢　五味子三錢　人參二錢
每服水一鍾半生薑五片煎臨卧溫服忌生冷油膩

○廣按此方治咳嗽痰喘攻補兼施也

烟筒喘嗽方

款冬花　佛耳草　凝水石　人參

白芷　金精石　銀精石等分　甘草少用

右為末不以多少用香爐燒烟籠筒吸入肺管用米飲下

○已上數方治咳嗽喘急肺脹之劑

半夏丸濟生方治肺臟蘊熱痰嗽胸膈塞滿

瓜蔞子去殼另研　半夏湯泡七次焙取末各一兩

右二件和勻薑汁打麵糊丸梧桐子大每服五十丸食後薑湯下

玉液丸和劑方治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石燒令赤出火毒水飛過三十兩　半夏洗焙為末十兩

白礬枯十兩細研

右合研麪糊丸如梧子大每服三十丸食後淡薑湯下

玉芝丸和劑方治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽喉不利

人參去芦　乾薄荷　白茯苓去皮　白礬枯

天南星米泔浸焙各三兩　半夏湯洗七次薑汁和作麯六十兩

右為末生薑汁煑麪糊丸如梧桐子每服三十丸食後薑湯

下如痰盛燥熱薄荷湯下

袪痰丸端竹堂方治風痰喘嗽

人參去芦　木香　天麻各一兩　槐角子七錢半

陳皮去白　茯苓去皮　青皮去穰　白朮煨各一兩

半夏七錢半　牙皂角去皮弦酥炙八九錢

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五七十丸食後臨卧溫酒送下姜湯亦可

利膈丸 拔粹方治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻

牽牛四兩生用 半夏湯泡二兩 木香半兩 青皮去白二兩

槐角一兩炒 皂角去皮弦酥炙二兩 加檳榔

大黃各五錢

右為細末生姜麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸生姜湯下

星香丸 治諸氣嗽生痰

南星 半夏各三兩用白礬一兩研同水浸二味一宿

陳皮五兩許浸一周時去白取三兩 香附子三兩皂角水浸一晝時晒

右四味不見火為末姜汁糊丸梧桐子大每服五十丸臨卧

薑湯下

此方家傳秘方累驗

星半丸　治諸般咳嗽

南星（姜製）　半夏麴　凝水石　枯礬

殭蚕（炒）　乾生薑（各一两）

右為末生姜汁糊丸如梧子每服五十丸姜湯下食後

瓜蔞半夏丸　治咳嗽喘滿

瓜蔞　杏仁（去皮尖）　枯礬（各一两）　半夏（湯泡二两）

款冬花（一两半）　麻黄（去根節一两）

右為末用瓜蔞汁生姜自然汁用水糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後臨卧淡茶湯下忌生冷鹹酸

玉壺丸　治風痰吐逆咳嗽

南星生用　半夏生用各一兩　天麻生用一兩　白麪三兩

右為細末同白麪和均滴水丸如梧桐子大曬乾每服三十丸以水一大鍾先煎令沸下之煮五七沸候藥浮起即漉出眼乾用姜湯下

透羅丹　治痰實咳嗽胸脇不利

皂角去皮弦酥炙　黑牽牛炒　半夏　大黃濕紙包炒焙一兩

巴豆一錢去油另研　杏仁去皮尖麩炒一兩

右為細末生薑自然汁丸如梧桐子大每服三十丸姜湯下咳嗽甚者三四服立効

一方　取痰

藜蘆　人參用芦各二兩　牙皂角去皮並泡一兩

防風去皮一兩　細辛去土各二兩半

右用酸漿水一碗食後溫服候吐痰覺胸中痰盡用冷葱湯時呷歛止為度

人參散直指方　治咳嗽痰壅通用

人參去芦　桔梗　半夏麯　五味子

細辛去葉　枳殼制　赤茯苓去皮　杏仁不去皮各一分

甘草炙半分

右㕮咀每服一两生薑五片烏梅半箇水二盞煎至八分服食後　一方無杏仁烏梅不用痰嗽加紫菀添甘草

人參飲　治痰嗽

半夏湯泡七次　南星　寒水石　柴胡去芦
五味子　猪牙皂角　甘草炙　欵冬花
熱加黄芩
右㕮咀每服八錢生薑五片水一盞半煎至八分臨卧通口服
人參飲子百一選方治痰嗽寒熱壅盛
人參去芦　桔梗　半夏　五味子
赤茯苓　白朮各一两　枳殼　甘草炙各半两
右㕮咀每服三錢水一盞姜五片煎七分空心服治寒壅著
加杏仁不去皮紫蘇各半两
辰砂半夏丸　治一切痰飲咳嗽
用大半夏一斤湯泡七次晒乾為末用生絹袋盛貯於磁盆

內用淨水洗出去麁楂將洗出半夏末就於盆內日晒夜露每日換新水七日七夜澄去水將半夏粉晒乾每半夏粉一两入飛過細硃砂末一錢用生姜汁糊為丸如梧桐子大每七十丸用淡生薑湯下食後服

黃芩半夏丸　治上焦有熱咳嗽生痰

黃芩末一錢　製過半夏粉一两

右二味和勻用生薑汁為丸如梧桐子大每服七十丸用淡生薑湯送下食後服

天竺黃餅子　治一切痰嗽吐焦有熱心神不寧其效甚驗

牛膽南星三錢　薄荷葉二錢　天竺黃二錢　硃砂二錢

片腦二分　茯苓一錢　甘草一錢　天花粉一錢

右爲末煉蜜入生地黄汁和藥作餅子每用一餅噙化下食

後服

白朮湯 濟生方治五臟受濕咳嗽痰多氣喘身體重著脈來濡細

白朮二两　五味子　半夏湯泡七次　白茯苓去皮

橘紅各二两　甘草炙半两

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時

○已上數方治痰飲咳嗽之劑

欵冬花散 和劑方治肺感寒邪咳嗽喘滿胸脇煩悶痰涎壅盛

喉中哮喘鼻塞流涕咽喉腫痛

杏仁　阿膠炒　麻黄去根節　半夏湯洗薑製

欵冬花各一两　桑葉　知母　甘草炙

貝母各二两

右㕮咀每服二錢水一盞姜三片煎食前溫服

洗肺散　治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩二錢　半夏三錢　天門冬去心　麥門冬去心

五味子各一兩半　甘草半錢　杏仁去皮尖

右㕮咀作一服水二鍾生姜五片煎至七分食後服滓再煎服

百花膏濟生方治喘咳嗽不已或痰中有血

款冬花　百合蒸焙各等分

右為細末煉蜜為丸龍眼大每服一丸食後細嚼姜湯下噙化尤佳

貝母散　御藥院方治咳嗽多日不愈

貝母去心　桑白皮　五味子　甘草半兩炙

知母一錢五分　款冬花二兩　杏仁三兩去皮尖

右㕮咀每服一兩水一盞半生姜三片煎至八分去滓温服食後

人參散聖惠方治諸咳嗽喘急不出言語年久五服日近三服効

人參　知母　貝母　半夏

杏仁　馬兜鈴去皮用肉　麻黄不去節各半兩

天仙藤二兩

右㕮咀每服八錢水二盞烏梅一箇蜜一匙煎至八分去滓温服食後臨卧服忌酒醋雞麪鹹酸生冷

○廣按古方治火欝乾咳嗽者甚少治風寒濕咳嗽者甚多

蓋由不分内外所因新久之異故也夫形寒飲冷新咳嗽有痰固當以温寒散濕為主如人参半夏之類可也若夫氣動火炎久咳嗽無痰又當以清熱潤燥為先然人参半夏之類又在所禁如天門麥門知母貝母石膏瓜蔞之類可也世人徒知肺主皮毛外感風寒為寒殊不知傳裏鬱久変為熱也况肺為華盖而五臟六腑火自内起薰蒸灼作咳嗽者亦良多矣已上諸方頗合亦須加減可也

○已上數方治火鬱咳嗽之劑

鍾乳補肺湯 和劑方 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳 碎如米 桑白皮 各三兩 肉桂 去皮 白石英 如米

五味子揀　款冬花去梗　紫菀洗去土　人參去芦二兩

麥門冬去心三兩

右除鍾乳白石英外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每服四錢水一盞半薑五片棗一枚粳米三十粒煎七分用綿濾去滓食後服

人參潤肺丸和劑方治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及療風壅痰實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參　款冬花去梗　細辛去葉　甘草炙各四兩

官桂去皮　桔梗各五兩　杏仁去皮炒四兩　知母六兩

右為末煉蜜丸如雞頭子大每服一丸食後細嚼淡姜湯下

人參養肺丸和劑方治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽喘

急胸中煩悸涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

人参　黄芪去芦蜜炙各一两八錢　瓜蔞根

白茯苓去皮各六两　杏仁去皮炒二两四錢

皂角子三百箇　半夏湯泡七次為末生姜和作麴四两炒

右為末煉蜜丸為彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯下

如喘急用桑白皮湯下

團参飲子　濟生方　治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血

增寒壯熱漸成勞瘵者

人参　紫苑茸洗　阿膠蛤粉炒　百合蒸

細辛洗去葉土　款冬花　杏仁炒去皮尖　天門冬湯泡去心

半夏湯泡七次　經霜桑葉　五味子各一两　甘草炙半两

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎七分食後溫服　氣欬加木香　唾血而熱加生地黄　唾血而寒加鍾乳粉　痰極咳嗽加黄芪　損肺唾血加沒藥藕節　嘔吐腹滿不食加白朮　咳而小便多者加益智仁　咳而面浮氣逆加沉香橘皮煎　大便溏者去杏仁加鍾乳粉

紫菀茸湯濟生方治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得安卧

紫菀茸洗　經霜桑葉　款冬花　百合蒸焙

杏仁去皮尖　阿膠蛤粉炒　貝母去心　蒲黄炒

半夏湯洗各一兩　犀角鎊　甘草炙　人参各半兩

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後溫服

人参保肺湯　治五劳七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱見

發熱類

補肺湯醫粹方治劳嗽

桑白皮　熟地黄各二两　人参　紫菀

黄芪　五味子各一两

右㕮咀每服一两水二盞煎至八分入蜜少許温服食後

寧肺湯楊氏家藏方治榮衛俱虚發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

人参去芦　當歸去芦　白术　熟地黄

川芎　白芍藥　甘草炙　五味子

麥門冬　桑白皮　白茯苓去皮各半两

阿膠蛤粉炒一两

右㕮咀每服一两生姜五片水二盞煎至一盞去滓通口服
食後

五味黄芪散 拔粹方 治嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦脚膝
無力

麥門冬去心 熟地黄 黄芪 桔梗各半两
人参三錢 甘草 芍藥 五味子各二錢
右㕮咀每服八錢水二盞煎至八分去滓温服食後

温金散 大全良方 治勞嗽

甘草 黄芩 桑白皮 防風各一两
杏仁一十七粒製 人参去芦 茯神各五錢
麥門冬去心三錢半

右以前五味用米泔水浸一宿晒乾次入人參茯神麥門冬三味同為末每服二錢水一盞蠟一豆大煎至八分食後温服

人參潤肺丸

人參　山藥　蓮肉　款冬花

蛤粉　杏仁去皮尖各一两　藕節五两

紅棗煮去核半斤　大蘿蔔一个煮熟

右為末棗肉丸梧子大每服五十丸白湯下食後

人參五味子散 聖惠方 治男女老稚諸虛百損氣血勞傷涎喘欬膿或嗽咯血寒熱往來夜有盗汗羸瘦困乏一切虛損

人參　五味子　桔梗　白朮

白茯苓　甘草炙　熟地黄　當歸酒洗

地骨皮　前胡去苗　桑白皮　枳殼去穰炒
黃耆炙　陳皮去白　柴胡各三錢
右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫服
食後日三煩渴加烏梅青蒿煎嗽膿血加知母阿膠煎尤妙

大寧嗽湯直指方治勞嗽諸嗽通用如神効
北五味　茯苓去皮　桑白皮炒　紫蘇
細辛　橘皮　枳殼麩炒　杏仁麩炒去皮
甘草炙　阿膠炒　粟殼去穰蜜炒各二錢
半夏湯洗五錢　勞嗽加川芎
右㕮咀每服一兩水二盞棗二枚姜三片烏梅半箇煎至一
盞溫服

加味人參紫菀散 直指方 治虛勞咳嗽

五味子　人參　紫菀茸　陳皮

貝母　紫蘇葉　桑白皮炒　白茯苓各一兩

杏仁炒去皮　甘草各七錢半　加川芎　半夏麴各一兩

阿膠蛤粉炒五錢

右㕮咀每服一兩水二盞薑七片棗二枚烏梅一箇煎至一盞溫服

人參蛤蚧散 治三年肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿日換水洗去腥酥炙黃

杏仁去皮尖　人參　甘草炙各五兩　知母

桑白皮　茯苓去皮　貝母各五两

右為細末净磁盒兒内盛每日用茶點服神効

○廣按治嗽方中多用人參以其肺虚故也然肺受火邪久嗽喘滿吐血與夫陰虚火動午後發熱薰嗽者切宜忌之然肺受寒邪喘嗽與夫陽虚火動晝夜發熱薰嗽者宜用亦須知母貝母天門冬麥門瓜蔞之類擇其一二味監制可也丹溪云予每治病以某藥為主治以某藥為引經以某藥為監制是也

○已上數方治勞嗽之劑

二母散

治嗽久不愈嘗著常服除根累効

知母　貝母等分

右為細末老生薑切片蘸藥細嚼白湯下

人參紫菀湯 百一選方 治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子 二錢半 杏仁 半兩 人參

紫菀 甘草 各二錢 縮砂 一兩 桂枝 二錢半

罌粟殼 去穰薑炒制 一兩 款冬花 半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片烏梅二枚煎服

人參理肺散 拔粹方 治喘嗽不止

麻黃 去節炒黃 一兩 粟殼 三兩炒 人參 二兩去芦

當歸 木香 各一兩 杏仁 三兩麩炒

右為粗末每服四錢水煎服

人參款花膏 和劑方 治肺受虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰

洩嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或勞虛冷嗽及遠年近日

一切嗽病服諸藥不効者皆治

款冬花去梗 人參去芦 北五味去梗炒 紫菀洗去芦

桑白皮各一两

右為末煉蜜丸雞頭實大每服一丸細嚼姜湯下臨卧食後服

人參款冬花散 拔粹方 治喘嗽久不已者

人參去芦 款冬花各五錢 知母 貝母

半夏各三錢 粟殼一两炒黄

右㕮咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至八分食後臨卧

溫服

補肺湯 直指方 治肺虛氣乏久嗽

阿膠炒 蘇子 桔梗 半夏制
甘草炙各半两 款冬花 砂仁 紫菀
細辛 杏仁去皮炒 陳皮去白 桑白皮炒
青皮去白 五味子 石菖蒲 草果各二錢半

右㕮咀每服一两水二盞生姜四片紫蘇三葉煎至八分温服

治多年喘嗽

人參 麻黃 甘草各二两

右爲末每服二錢杏子五箇擂碎無根水同煎和渣食後服

治遠年近日一切咳嗽

人參 五倍子 杏仁去皮尖各五錢
半夏[illegible]錢

[illegible][illegible]蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明礬五錢為
末一味入蘿蔔內以頂蓋紙裹煨研丸每服十丸臨卧烏梅
湯

人參湯 經驗方治遠年嗽

麻黃去節 杏仁去皮尖炒各一兩 甘草炙四兩

桑白皮 五味子 粟殼制 陳皮各五錢

麥門冬三錢 紫菀一兩 人參去芦四錢 阿膠七錢

右㕮咀每服一兩水二盞煎至八分去滓溫服食後

治多年嗽 百一選方

杏仁去皮尖 半夏湯泡七次 南星生用 甘草生用各等分

右㕮咀每服八錢生姜七片棗一枚水一盞半煎至八分食

後温服

諸般嗽不已

粟殼 製　烏梅 去核　陳皮 去白　人參 去芦

木香　五味子　桔梗 炒　杏仁 去皮尖炒

石膏　甘草

右㕮咀每服八錢鹽水二盞煎至八分去滓温服食後

九仙散　治一切咳嗽

人參　款冬花　桔梗　五味子

阿膠　烏梅 各一兩　貝母　罌粟殼 各半兩

桑花 一兩

右為細末每服三錢白沸湯點服

人參清肺湯和劑方治肺胃虛熱咳嗽喘急坐卧不安并治久年勞嗽唾血腥臭

阿膠炒　杏仁去皮炒　桑白皮　地骨皮

人參　知母　烏梅去核　甘草炙

罌粟殼去蒂蓋蜜炙各等分

右㕮咀每服三錢水盞半生薑棗子各一枚煎至一盞食後温服

○已上數方治咳嗽喘急久不愈之劑

○廣按肺主皮毛人之無病之時榮衛周流內氣自皮膚腠理普達於外一或風寒外束則內氣不得於外達便從中起所以氣升痰上故咳嗽宜用辛温辛凉之劑以發散風

寒則邪退正復而嗽止也又按肺為華盖凡飢飽勞役喜怒憂恐與夫飲醇醪食厚味則火升痰上而傷於肺亦作咳嗽宜用降火豁痰之劑則火降痰消而咳止也又按肺主氣運行血液周流一身金也肺受火邪氣從火化有升無降為嗽為喘久而不治虛極至損則不能運行氣液發為煩熱驚悸咳唾粘涎膿血宜用補虛潤燥開鬱散火之劑則肺得清正而嗽止也故治咳嗽要知新久之異虛實之殊補瀉之宜也矣

欬嗽治例　出明醫雜著

王節齋曰欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰欬嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊

而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也

主方

杏仁去皮尖　白茯苓各一錢　橘紅七分　五味子

桔梗　甘草各五分

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏各一錢麥門冬炒黃芩知母各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛凉解散加防風薄荷紫蘇炒黃芩麥門冬各一錢

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒黄芩麥門冬石膏各一錢

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼术桑白皮各一錢防風黄芩山梔炒各五錢

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黄桂枝半夏生乾薑防風各一錢肺經素有熱者再加酒炒黄芩知母各五分若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎前胡柴胡各一錢

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星姜汁炒濕痰脾困少食加白术蒼术　有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知母蜜水拌炒貝母瓜蔞仁黄芩炒

若夏月熱痰或素熱有痰加黄芩黄連知母石膏

上半日欬者胃中有火加貝母石膏黃連　五更嗽者同治
黃昏欬者火浮於肺不宜正用寒凉藥宜加五味子訶子皮
斂而降之
若咳嗽久肺虛滋氣補血加人參黃耆阿膠當歸生薑天門
冬款冬花馬兜鈴酒芍藥之類肺熱喘咳去人參用沙參
此兼補氣血也
若午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加川芎當歸芍
藥熟地黃黃栢知母竹瀝姜汁天門冬瓜蔞仁貝母此專
補陰血也
若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜用鬱消痰用訶子皮便香附
瓜蔞仁半夏麴海石青黛黃芩為末蜜調為丸噙化仍服

前補陰降火湯藥失治則成勞

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蔞仁貝母海石青黛半夏麯糵石膏山楂子枳實薑炒黃連為末蜜調噙化

若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑白皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而變為火火盛而陰虛不得安寧從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參等甘溫補氣之藥然亦有氣虛而咳血者則宜用人參黃耆款冬花之藥但此等證不多耳

因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治嗽也

○肺痿

丹溪心法

肺痿治法在乎養血養肺養氣清金　曾治一婦人二十餘歲胸膺間一竅口中所咳膿血與竅相應而出以人參黃芪當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈

附脉理

脉訣舉要曰寸數虛濇肺痿之形

附諸方

人參養肺湯　治肺痿證咳嗽有痰午後熱并聲嘶者

人參去芦　甘草　阿膠珠各一錢　茯苓一錢半

柴胡四錢　五味子　貝母　杏仁炒

桔梗炒各一錢半　桑白皮二錢　枳實一錢五分

右㕮咀每服八錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至八分食後溫服

知母茯苓湯宣明方治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓　甘草炙各一兩　知母　五味子

人參去芦　薄荷　半夏洗七次　柴胡去苗

白术　款冬花　桔梗　麥門冬去心

黄芩各半兩　川芎　阿膠炒各三錢

右㕮咀每服一兩水二盞生薑十片煎至一盞去渣通口服食後

人參平肺散拔粹方治心火尅肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅

盛胸膈治滿咽嗌不利

桑白皮炒二兩 知母七錢 甘草炙 地骨皮各半兩

五味子三百粒 茯苓 青皮 人參各四錢

陳皮去白半兩 天門冬去心四錢 如熱加黄芩四錢紫蘇葉

半夏各半兩

右㕮咀每服五錢水二盞生姜三片煎至八分去滓温服或為末薑汁丸彈子大噙化亦得食後

紫菀散拔粹方 治咳嗽唾中有膿血虚勞證肺痿變癰

人參一錢 紫菀半錢 知母一錢半 貝母一錢半

桔梗一錢 甘草半錢 五味十五粒 茯苓一錢

阿膠炒五分

右㕮咀水煎服一云各等分水二盞生薑三片煎至一盞食
後服
劫勞散夜粹方治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過
即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神
氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽唾中有紅線名曰肺痿若
不治便成羸劣之疾
白芍藥六兩 黃芪 甘草 人參
半夏洗 白茯苓 熟地黃 當歸
五味子 阿膠炒各二兩
右㕮咀每服一兩水二盞生薑三片棗三枚煎至一盞服不
拘時

○肺癰

丹溪心法

肺癰已破入風者不治　用醫壘元戎搜風湯吐之　或用太乙膏成丸食後服　收斂瘡口止有合歡樹皮白斂煎飲之合歡即槿樹皮也又名夜合

附論

慮按書云咳嗽有濁唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿血名曰肺痿熱在上焦故也如口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛名曰肺癰欬傷肺葉成也

附脉理

脉訣本要曰寸數而实肺癰已成寸數虛濇肺痿之形肺癰色

白脉宜短濇死者浮大不白而赤

附諸方

桔梗湯 济生方 治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤澁

桔梗 去芦 貝母 去心膜 當歸 去芦酒浸 瓜蔞子

枳殼 去穰麸炒 薏苡仁 炒 桑白皮 蜜水炙 防己 各二两

黄芪 去芦一两半 甘草節 生用 杏仁 去皮尖麸炒

百合 蒸各半两

右㕮咀每服五錢水盞半生薑五片煎八分不拘時服如大
便祕加大黄小便赤少加木通

消膿飲 直指方 治肺癰膿腥氣上衝而嘔咳嗽

南星 生一 知母 貝母 白芷

生地黄 阿膠炒 川芎 桑白皮炒
白芨各半两 甘草炙 防風 射干
桔梗 紫蘇葉 天門冬去心 薄荷
杏仁不去皮 半夏薑製各七錢半

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片烏梅一箇煎至八分食後溫服

黄芪散 治肺癰

用白紫蜜炙爲細末每服一大匙食遠 黄芪湯調服 効

一方 治肺癰吐膿

桔梗炒一兩 甘草炙半兩

右每服一兩水一鍾半煎八分空心服吐盡膿爲効

霍亂十七　丙集

丹溪心法

○内有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加减作吐以提其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽不升陰不降乖隔而成切莫與穀食雖米飲一呷入口即死必待吐瀉過二三時直至飢甚方可與稀粥食之脉多伏欲絶　見成吐瀉不徹還用吐提其氣起或用樟木煎湯吐之亦可　大法生薑理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散有吐者以二陳湯探吐亦有可下者　轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也　轉筋皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼朮

南星煎服　乾霍亂者最難治死在須臾升降不通當以吐提其氣極是良法世多用塩湯此係內有物所傷外有邪氣所遏有用吐者則兼發散之義有用温藥解散者不可用凉藥宜二陳湯加解散藥

二陳湯加　川芎　蒼朮　防風

白芷 又云白朮

右剉薑五片煎服

治霍亂方

蒼朮　厚朴　陳皮　葛根各一錢半

滑石三錢　白朮二錢　木通一錢　甘草炙

右剉入薑煎湯下保和丸四五十九

戴云霍亂者吐也有聲有物凡有聲無物而躁亂者謂之乾霍亂也

二陳湯見痰類

理中湯見中寒

五苓散見温熱

四物湯見補損

附論

廣按人於夏月多食生冷因脾虛不能運化加以外感風寒則揮霍亂上吐下瀉也人見倉卒躁擾痛悶似有神鬼然實非鬼神乃飲食痞隔上下不通將欲吐瀉故如是也

附脈理

脈訣舉要曰滑數為嘔代者霍乱微滑者生濇数凶断又曰滑而不匀必是吐瀉霍乱之候脉代勿訝

附諸方

薑附湯　治中寒霍乱轉筋手足厥冷

理中湯　治中寒霍乱吐瀉　並見中寒

通脈四逆湯 濟生方 治霍乱多寒内冷脈絶

呉茱萸炒二两　附子泡一两　桂心去皮不見火　木通

細辛　白芍藥　甘草炙各半两　當歸去芦三錢

右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞薑七片棗一枚煎七分温服

七氣湯 三因方 治七氣欝結五臓之間互相刑剋陰陽不和揮霍变乱吐利交作

半夏湯洗五兩　厚朴薑制　桂心各三兩　白芍藥

茯苓去皮各四兩　紫蘇葉　橘皮各二兩　人參去芦各一兩

每服四錢水一盞酒半盞生薑七片棗一枚煎七分溫服

五苓散　治霍乱吐瀉煩渴引飲　見溫熱

香朴飲子　治伏熱吐瀉虛煩作乱　見中暑

霍香正氣散　治中溫霍乱吐瀉

不換金正氣散　治霍乱轉筋嘔吐泄瀉頭疼　並見胃寒

二香散　治暑溫相搏霍乱轉筋煩渴悶乱

藿香二兩　半夏　陳皮　桔梗

白术　大腹皮　茯苓　厚朴

紫蘇　白芷各一兩　甘草二兩半　黃連二兩

香薷一斤　扁豆半斤

每服用水一鍾半生薑三片葱白二根煎食後熱服此即霍香正氣散黄連香薷飲相合也

既濟湯醫方集成治霍乱後虛煩不得眠

人參去芦　甘草炙　淡竹葉炙各半兩

麥門冬去心一兩　附子炮半兩　半夏湯洗五錢

右㕮咀每服四錢水二盞薑五片粳米百餘粒煎空心温服

麥門冬湯濟生方治霍乱已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心　橘皮去白　半夏湯泡七次　白茯苓去皮

白朮各一兩　人參去芦　甘草炙各半兩　小麥半合

右㕮咀每服四錢水盞半薑五片烏梅少許煎八分温服

木瓜湯直指方治霍乱吐瀉轉筋擾悶

酸木瓜二两　茴香微炒三錢半　甘草炙二錢

吴茱萸洗炒七次二两

右㕮咀每服四錢薑五片紫蘇十葉煎服空心

桂苓甘露散　治中暑霍乱吐瀉煩渴引飲　見中暑

加減理中湯

人參　白术　乾薑　甘草炙各等分

若為寒氣溫氣所干者加附子一两名附子理中湯　若霍乱吐瀉加陳皮青皮各一两名治中湯　若乾霍乱心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥　若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一两每服生薑十片同煎　若泄

瀉者加橘紅茯苓各一两名補中湯　若溏泄不已者於補中湯内加附子一两　不喜飲米穀不化者再加縮砂仁一两共成八味　若霍乱吐下心腹作痛手足逆冷於本方内去白术加熟附名四順湯　若傷寒結胷先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胷痞欲絶心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一两名枳實理中湯　若渴者再加枳實理中湯内加栝蔞根一两　若霍乱後轉筋者理中湯内加火煆石膏一两　若臍上築者腎氣動也去术加官桂一两半腎悪燥故去术恐作奔豚故加官桂　若悸多加茯苓一两　若渴欲飲水者添加术半两　若腹滿者去白术加附子一两　若飲酒過多及啖炙煿熱食發為鼻衄加川

芎一两　若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血
脉只用本方

三因白朮散　治中暑嘔吐暈眩及大病後調理失宜勞復如
初及脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水滑泄腹鳴飲
食所傷霍乱吐瀉並宜服之

白芷　甘草　青皮去白　白茯苓
桔梗　山藥　香附子各三两　乾薑半两
白朮　陳皮

每服水一鍾生薑三片棗一枚木瓜一片紫蘇葉三二皮煎
食前服　若吐瀉加白梅煎　喘加桑白皮杏仁　傷寒勞
復加薄荷　腸氣加木通入麝香少許　中暑嘔逆加香薷

霍乱加藿香

産後泄瀉加荊芥　氣厥入塩煎服

調中白术散 治大病後吐瀉煩渴霍乱虚損氣弱及酒毒嘔噦

白术　茯苓去皮　人参各半两　甘草一两五錢炙

木香一錢　藿香半两　葛根一两

右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二两甚者加薑汁

人参散 經驗方 止吐逆及治瀉後煩渴常服調中和氣

茯苓去皮　人参各半两　葛根一两　藿香去土

木香　甘草炙各一錢半

右㕮咀每用水二盞煎至一盞通口服瀉後渴甚者加滑石

一錢

止渴湯 經驗方 治霍乱煩渴

甘草炙　人參去芦　麥門冬去心　茯苓去皮

桔梗　瓜蔞根　澤瀉　葛根各半两

右為末蜜湯調二錢下

回生散　百一選方治霍乱吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮去白　藿香去土等分

右㕮咀每服一两水二盏煎至一盏去滓温服不拘時候

薑鹽飲　直指方治霍乱欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一两　生薑半两切

右同炒令色変以水一椀煎熱温服甚者加童子小便一盏

治絞腸沙證　經驗方治手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸温水於病者膝腕内拍打有紫黒點處以鍼刺去惡血即愈又一

法用麻弦小竹弓蘸香油或熱水括手足胸背額項即愈

備急大黄丸　療心腹諸痛卒暴百病用此藥吐下即愈　方見傷食

○廣按乾霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣被鬱而不能行所以卒痛而手足厥冷惡心嘔噦也俗名攪腸沙者蓋言痛之甚也除用藥不言外北方刺青筋以出氣血南方括胸背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之為愈也蓋霍亂乃氣病非血病也今則青筋固能散氣而血因之以傷兒人之一身氣常有餘血常不足今不足者又從而傷之是不足之中又不足也少壯之人庸或得免而衰老之人則不免於死也何以言之氣為血之

先道血為氣之依附今陰血既乏則陽氣失其依附必然
發越不死何待書曰陽虛必惡寒陰虛必發熱蓋氣有餘
便生火火動則發熱熱久而陰血愈消經曰陰虛則病陰
竭則死此之謂也

暑門

瘧十八

丹溪心法

瘧疾有風　暑　食　痰　老瘧　瘧母　大法風暑當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也　惡飲食者必自飲食上得之　無汗者要有汗散邪為主帶補　有汗者要無汗正氣為主帶散　一日一發者受病一月　間日一發者受病半年　三日一發者受病一年　二日連發住一日者氣血俱病　瘧病感虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳

湯加柴胡黄芩常山草果煎服　久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼术　一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截　老瘧病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎　撫芎　紅花　當歸　炒柏

白术　蒼术　甘草　白芷

右剉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之若在陰分者用藥徹起陽分方可截即前藥之属

充按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎蒼术

乾葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

截藥常山飲

穿山甲炮　草果　知母　檳榔　烏梅

甘草炙　常山

右㕮咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐為順

一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮

又方

柴胡　草果　常山　知母　貝母

檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

又治瘧母此藥消導

青皮　桃仁　紅花　神麯　麥芽

鱉甲醋炙　三稜　莪朮　海粉　香附並用醋煮

右為末丸如梧子大每服五七十丸白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲水水外多汗出

人參　白朮　黃芪　黃芩　黃連

山梔炒　川芎　蒼朮　半夏　天花粉

右㕮咀水二鍾薑三片煎服

又治瘧疾發渴

生芐　麥門冬　天花粉　牛膝　知母

葛根　炒栢　生甘草

右㕮咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿半斤 冬瓜葉 官桂 馬鞭草

右焙乾爲末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一時服盡 又云青蒿半斤冬青葉二兩馬鞭草二兩桂二兩未知孰是姑兩存之以俟知者

截瘧

檳榔 陳皮 白术 常山各三錢 茯苓

烏梅 厚朴各一錢半

右㕮咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一日一服臨發日早一服服後少睡片時

又瘧疾後

白朮 半夏一兩 黃連半兩 白芍三錢 陳皮半兩

右為末粥丸梧子大每服六十丸姜湯下

附諸賢論

心法附録曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒況其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅為主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰温瘧此言是但三陰經說不明凡作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

附脈理

脉訣舉要曰瘧脉自弦弦遲多寒弦数多熱隨時變遷

心法附録曰瘧脈多弦但熱則弦而帶数寒則弦而帶遅亦有病久而脉極虚微而無力似乎不弦然而必於虚數之中見弦但不搏手耳細察可見也

附諸方

黄連香薷飲　治伏暑發瘧煩渴者　見中暑

桂枝羗活湯　拔粹方　治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮悪寒有汗者

桂枝　羗活　防風　甘草各半两

右為粗末每服半两水煎如吐加半夏麯等分

麻黄羗活湯　拔粹方　治瘧疾頭痛項強脈浮悪風無汗者

麻黄去節 羌活 防風 甘草各半兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎至如吐加半夏麯等分

麻黄桂枝湯 拔粹方 治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

麻黄一兩去節 炙甘草三錢 黄芩五錢

桂二錢 桃仁二十箇去皮尖

右為末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用此湯散血中風寒也

桂枝黄芩湯 拔粹方 治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也

甘草 人參 黄芩各四兩半 半夏四錢

柴胡一兩二錢 石膏 知母各五錢 桂枝二錢

右為粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯 拔萃方 治瘧疾先寒後熱熱多寒少

桂枝五錢 石膏 知母各一兩半 黄芩一兩

右為細末三分服每水二盞煎服間日者邪氣所合故也

○已上數方發散之劑

人參養胃湯 治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四獸飲之類截之因食倍加草果 見胃寒類

萬安散 濟生方 治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效氣虛胃弱及娠婦不宜服之

蒼术泔浸去皮炒 厚朴姜製炒 陳皮去白 檳榔

恒山酒浸 甘草炙各一錢半

右㕮咀水一盞半煎至一盞露一宿當發前作二服忌熱性物片時

定齋草果飲簡易方快脾治瘧

草果 蒼朮泔浸 厚朴 陳皮 半夏麴

甘草炙 烏梅去核各等分

右㕮咀每服半兩水盞半薑五片棗二個同煎七分不拘時服寒多者加乾薑附子熱多者只加柴胡瘴瘧加檳榔

柴胡桂薑湯活人方治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者并治勞瘧

柴胡四兩 桂枝去皮一兩半 黃芩一兩半 瓜蔞根一兩

牡蠣炮碎炒 甘草炙 乾薑各半兩炮

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服

柴胡加桂湯 活人方 治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡八兩去苗 人參去芦 甘草炙 半夏炮七次

黄芩 肉桂去皮各二兩

右㕮咀每服五錢水盞半姜七片棗二個煎服若渴者去半夏加人參瓜蔞根同煎服之

○已上數方治瘧寒多熱少發散之劑 無汗可用

小柴胡湯 治瘧疾熱多寒少但或單熱頭疼口乾胸滿者方

見温熱類

柴胡括蔞根湯 治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡去苗一兩七錢半 天花粉一兩 黄芩去黑心 人參

甘草炙七錢半

右服一兩薑五片棗一枚水二盞煎一盞去渣通口服

白虎加桂枝湯活人方治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母六兩甘草炙三兩桂枝三兩粳米三兩石膏一斤

右㕮咀每服五錢水盞半煎至一盞去滓溫服

清脾飲濟生方治癉瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澁

青皮去白厚朴姜製白朮 半夏湯洗七次

黄芩 草果仁 柴胡去苗 茯苓去皮甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎七分溫服不拘時候

參蘇飲 治發瘧熱多寒少兼咳嗽者 見傷風類

驅瘧飲　治發瘧熱多寒少者

前胡　柴胡各四兩　桂心　桔梗　厚朴

半夏各三兩　黃芪　乾姜炮　甘草炙各二兩

右剉水二盞生姜三片棗四個煎

○已上數方治瘧熱多寒少發散之劑有汗可用

大柴胡湯　治瘧熱多寒少目痛多汗脈大以此湯微利為度

餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪　方見溫熱類

白芷石膏三物湯

白芷一兩　知母一兩七錢　石膏四兩

右為粗末每半兩水一盞溫服清

○已上二方治瘧熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲簡易方治五臓氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲
與衛氣相搏發為瘧疾
人參去芦 白术 茯苓去皮 橘紅 草果仁
半夏湯泡 棗子 生薑 烏梅去核各等分
甘草炙減半
右㕮咀以塩少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮
令香熟焙乾每服半兩水二盞煎六分未發前併進數服

七寶飲簡易方治一切瘧疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱
如瘧
厚朴姜製 陳皮 甘草炙 草果仁 常山雞骨者
檳榔 青皮各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東温服嚥少須時須忌熱性物寒多加酒服

清肺湯 三因方治飲食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴四兩姜製炒　烏梅去核　半夏湯去滑　青皮

良薑各二兩　草果去皮一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未發前併三服忌生冷油膩之物

○已上三方治瘧寒多熱少止截之劑

常山飲 和劑方治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母　川常山　草果各三兩二錢　良薑二兩

甘草　烏梅去核各一兩六錢

右㕮咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分温服

六和湯

人參　知母　草果　貝母　烏梅

白芷　檳榔　柴胡各一錢用酒拌常山二錢

右剉姜三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

○已上二方治瘧熱多寒少止截之劑

鬼哭丹　治瘧二三日一發者

常山一斤醋浸春五夏三日秋七冬十日檳榔各四兩

半夏　貝母各二兩

右為末用雞子清麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸隔夜

臨睡冷酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸　治瘧三日一發或十日一發

薑黄三錢　白朮一两半　人參　檳榔　草果

莪朮醋炒　厚朴各半两　黄芩　半夏　青皮各一两

甘草三錢

右為末飯丸如梧子大每六十丸食遠白湯下日二服

紅丸子　濟生方專治食瘧

青皮炒三两　阿魏醋化二錢五分　蓬朮醋煮　京三稜醋煮各二两

胡椒一两

右為末别用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十丸至百丸淡薑湯下或因食生果成瘧用麝香湯吞下

老瘧飲　三因方治久瘧結成癥瘕痃癖在胸脇諸藥不愈者

蒼术泔浸 草果去皮 桔梗 青皮 陳皮
良姜各半两 白芷 茯苓 半夏湯洗去滑
甘草炙 枳殼麸炒 桂心 乾薑炮各三錢
紫蘇葉 川芎各二錢
右㕮咀每服四錢水一盞塩少許煎七分空心服

山甲湯 久瘧瘧母不治者宜服四獸飲間服此湯
川山甲 木鱉子等分
右為末每服二錢空心温酒調下

鱉甲飲子 濟生方 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母
草果仁 鼈甲醋炙 黄耆去芦 白朮 白芍藥
厚朴姜製炒 檳榔 木紅 川芎 甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一鍾姜七片棗一枚烏梅少許煎溫服

十將軍丸 久瘧不瘥服痛有瘧母

三稜一兩去毛土炮 青皮去白 陳皮去白各一兩

草果去殼二兩 川常山二兩 砂仁 檳榔

烏梅 半夏湯泡七次各一兩

右先將常山草果二味剉用好酒醋各一碗入瓦器內先浸一宿後入八味藥同浸至晚用瓦銚內炭火煮乾取出晒如無日色用火焙乾為末半酒半醋打糊為丸如梧桐子大每服三四十丸白湯吞下日進三服忌生冷魚腥醎酸油膩熱諸苑毒物服四兩至八兩即除根丸有積聚及行瘴濕地方宜服之

○已上諸方消導之劑

四將軍飲 良方 治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時急救之方用之有驗

附子 一箇炮去皮　訶子 四箇去核　陳皮 四箇全洗淨

甘草 炙四錢

右㕮咀爲四服每服水一鍾半生薑七片棗七枚煎取一半令熱灌病者立可甦省

○廣按瘧疾發作而僵仆不省人事者蓋由頑痰老痰膠固於中榮衛不行故也所以中風中暑而卒倒不省人事者亦由痰之所致也附子之性太熱走而不守本是治寒濕之藥今瘧疾發作僵仆而用之以其性大熱能開散頑痰使

榮衛得行故耳乃是刼劑非正治之藥也

露薑飲 潛齋方

用生薑四兩和皮擣汁一碗夜露至曉空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱

廣按生薑自然汁凡中風中暑中氣中毒乾霍亂一應卒暴之症與童便同用立可解散蓋生薑能開痰童便能降火故也

分利順元散 潛齋方 治体虛之人患瘧疾寒多不可用截藥者

川芎 附子各一兩 南星一兩 木香五錢另剉臨時入

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和㕮咀每服四錢棗七枚生姜十片水一鍾煎七分當發前

一日及當發日早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

一方　治久瘧

用青蒿桂枝各為末若寒多用桂多蒿少熱多用蒿多桂少三七分互用各以生薑二兩連皮搗汁和熱酒調服以衣被蓋卧即愈

雄黃散 保命集 治久瘧不能食胸中兀兀欲吐而不吐此藥吐之必愈

雄黃　瓜蒂　赤小豆 各等分

右為細末每服半錢温水調下以吐為度

辰砂丸 宣明方 治一切脾胃虛瘧熱毒者

信砒　甘草 各一錢　硃砂 二錢　大豆 四十九粒

右為末滴水和丸勻分作四十九丸服發日日欲出煎桃心湯下一丸忌熱性物

剋效餅子 和劑方治一切瘧疾發作有時先覺伸欠乃作寒慄股振頭頷中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已或內外皆熱頭痛如破渴飲冷水或痰聚胸中煩滿欲吐或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒少或但熱不寒但寒不熱或一日或隔日或發後六七日再發皆治之

龍腦　麝香　定粉 研各五錢　荷葉

菉豆　甘草 㶷各五兩　硃砂 一兩二錢半研

信 醋煮二兩半　金箔 二十五个為衣

右為末煉蜜搜和勻每兩作二十丸捏匾金箔為衣每服一

餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日發者頭夜服
隔數日發者前一日夜服連日發凌晨服

不二散

人言一兩為末　飛麪四兩與人言水和軟餅鍋內焙乾為末

白扁豆末二兩　細茶末二兩

右同和勻每服小半錢巳前半日用溫茶調下再用茶盪淨

忌食酒麪魚等物

雄硃丹

用椎黑豆四十九粒五月五日以冷水浸從早至巳時去皮
眼乾研為末入信末一錢再研勻細為丸雄黃為衣晒乾收
貯少壯人為梧桐子大衰老人如小黄豆大小兒如菉豆大

臨發時五更面東井水下一丸不止并服黑豆圓者是

一方 治久瘧

天南星二枚 好信三錢

右先將南星開孔用信三錢研為末裝入孔內兩星相對用泥固濟炭火煅存性取出研為細末用菉豆粉打糊為丸如豆大每服一二丸臨發日五更溫茶清下白湯亦可

一方

人言二錢 雄黃 菉豆各五錢

右為細末麪糊為丸如筋頭大硃砂為衣每服一丸用桃柳條各七寸煎湯露一宿臨發日空心服面向東忌食熱物魚腥油膩十日

瘧疾良方 百一選方 今人治瘧疾多用常山砒霜之類發吐取涎縱使得安脾胃不能不損不若此藥最為穩當

辰砂 光明者 阿魏 真者各一兩

右研勻和稀糊為丸如皁角子大每服一丸空心人參湯下

○已上數方劫奪之劑

灸法 濟生方 治瘧疾久不愈

不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立効

或灸第三骨節亦可

對金飲子 和劑方 治寒熱瘧疾愈後理調脾胃

厚朴 去皮姜汁炒 蒼朮 泔浸去粗皮 甘草 炙各二兩

陳皮 去白

右㕮咀每服四錢水一鍾姜三片棗一箇煎服一方加草果

倍用蒼术名草果平胃散

正氣散 徐同知方退寒瘧止胃寒進食

藿香四两 草果四两 半夏 陳皮 厚朴

砂仁 甘草各一两

右剉為散生姜棗子煎溫服如瘧未至候發日早服

草果飲 和劑方治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

紫蘇 草果仁 良姜炒 川芎 青皮

甘草炙 陳皮去白 白芷各等分

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分熱服

○已上數方治瘧初愈理脾進食之劑

○廣按瘧疾之源蓋由暑月中表氣虛而致中氣虛則水穀停聚而於痰飲於胸脇矣表氣虛則風暑入內而使血液稽留於經絡矣久則痰飲血液沸鬱稠粘膠固痞塞不通人之榮衛晝行陽分二十五度脊與背也夜行陰分二十五度胸與腹也榮衛行到病所不通乃作寒戰股振頭頷中外皆寒腰脊俱痛此正氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲水煩滿欲吐自汗此邪火發於外也或獨寒而無熱或寒多而熱少或無汗者宜開鬱豁痰為主用人參養胃湯草果飲子之類以發散之或熱多而寒少或獨熱而無寒或有汗者宜清熱補虛為主用白虎加桂枝湯小柴胡湯之類以發散之用發散之藥三五服後

則用四獸飲六和湯之類以截之或瘧久在陰分亦須
血藥徹起陽分然後截之可也

瘧疾治例 出明醫雜著

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去苗 白朮各一錢 蒼朮泔浸一錢 已上三味瘧疾必用之

陳皮七分 甘草炙五分 乾葛一錢二分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黄芩茯苓半夏各一錢 熱甚頭痛再加川芎軟石膏各一錢 口渴加石膏知母麥門冬各一錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黄酒炒知母各一錢 酒洗紅花酒炒黄蘗各四分 提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黄芪白茯苓各一錢 以補氣川芎當歸白芍藥熟地黄各一錢 以補血

若陽瘧多汗用黄芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白朮

黄芩乾葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黄黄芪黄蘗以歛之無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰有汗者要無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參一錢半酒炒芍藥大麥芽各一錢

若傷食痞悶或有食積者加神麯麥芽枳實炒各二錢炒黄連五分

若痰盛加薑製半夏南星枳實炒各一錢黄芩黄連各六分

若欲截之加檳榔黄芩青皮常山各一錢烏梅肉三箇肥者

若日久虚瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用

四君子合四物湯加柴胡黄芩黄耆陳皮以滋補氣血

痢 十九　　　丁集

丹溪心法

○痢赤屬血　白屬氣　有身熱　後重　腹痛　下血　身熱挾外感小柴胡湯去人參　後重積與氣墜下之故兼升兼消宜木香檳榔丸之類不愈者用秦艽皁角子煨大黄當歸桃仁黄連枳殼若大腸風盛可作丸服　保和丸亦治因積作後重者五日後不可下蓋脾胃虛故也　後重窘迫者當和氣木香檳榔　腹痛者肺金之氣鬱在大腸之間如實者以劉氏之法下之虛則以苦梗開支然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥有熱用黄芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥姜桂之屬　下血

四物湯為主　下血多主食積與熱或用朴硝者　青六丸治血痢效　痢疾初得一二日間以利為法切不可便用止澁之劑若實者調胃承氣大小承氣三一承氣下之有熱先退熱然後看其氣病血病加減用藥不可便用參朮然氣虛者可用胃虛者亦用之　血痢久不愈者屬陰虛四物湯為主凉血和血當歸桃仁之屬　下痢久不止發熱者屬陰虛用寒凉藥必兼升散藥并熱藥　下痢大孔痛者因熱流於下也以梹榔木香黃連黃芩炒乾姜　噤口痢者胃口熱甚故也大虛大熱用香連丸蓮肉各一半共為末米湯調下又方人參二分姜炒黃連一分為末濃煎終日細細呷之如土則再服但一呷下咽便開人不知此多用温熱藥甘味此以火濟火以滞益滞　封臍引熱

下行用田螺肉搗碎入麝香少許盦臍内　下痢不治之證下如魚腦者半死半生下如塵腐色者死下純血者死下如屋漏水者死下如竹筒注者不治　赤痢乃自小腸來白痢乃自大腸來皆濕熱為本赤白滯濁同法　下痢有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主木故也有濕傷血宜行濕清熱　内經所謂身熱則死寒則生此是大槩言必兼證詳之方可今豈無身熱而生寒而死者　脉沉少留連或微者易治洪大數者難治也脉宜滑大不宜弦急　仲景治痢疾溫者五法可下者十去或觧表或利小便或待其自已還分易治難治不治之證至為詳密但與瀉同立論不分學者當辯之　大孔痛　曰溫之一曰清之按久病身冷脉沉小者宜溫宜補暴病身熱脉浮洪者宜

清有可吐者亦有可汗可下者　初得之時元氣未虛必狂瀉之此通因通用之法稍久氣虛則不可下壯實初病宜下虛弱衰老久病宜升之　先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此腎傳脾微邪易愈　下痢如豆汁者濕也盖脾胃為水穀之海無物不受恒兼四臟故五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之因熱而作不可用巴豆如傷冷物者或可用宜謹　又有時疫作痢一方一家之内上下傳染相似却宜明運氣之勝後以治之

戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治但分新舊更量元氣用藥與赤白帶同

八方

黃連　滑石　甘草　白芍
蒼朮　白朮　當歸　青皮
條芩
右剉水煎裏急後重炒黃連滑石加桃仁檳榔甚者大黃嘔
者用姜汁半夏
又方
乾薑一錢　當歸二錢半烏梅三個　栢一錢半
黃連
右剉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳殼
又方　治熱與血
大黃　黃連　黃芩　黃栢

枳殼　當歸　芍藥　滑石
桃仁　甘草　白术等分
右為末或湯調或作丸用麪糊或神麯糊丸服　一本云誤服熱藥澁藥毒犯胃者當明審以祛其毒

治白痢

蒼术　白术　神麯　茯苓
地榆　甘草
右剉水煎

治赤痢

地黃　芍藥　柏　地榆
白术

右剉水煎　腹痛加枳殼厚朴後重加滑石木香檳榔有熱

加黃芩山梔

又治痢方

滑石一两　蒼术半两　川芎三錢　桃仁

芍藥半两炒　甘草一钱

右為末姜一片擂細煎滚服

又方　孫郎中飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼术　白术　厚朴　茯苓

滑石

右㕮咀水煎下保和丸　又云加炒麯甘草

又方

蒼朮　酒柀　白芍各二兩半　酒栢炒半兩

右為末粥丸以四物湯加陳皮甘草水煎湯下

又方　痢後腰痛兩脚無力

陳皮　半夏　白芍各一錢　茯苓

蒼朮　當歸　酒芩各半錢　白朮

甘草各二錢

右㕮咀作一服薑煎食前服

又方　治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮　白朮　黃芩　滑石

白芍　茯苓　甘草　陳皮

神麯炒

右㕮咀水煎下保和丸

一老年七十面白脈弦數獨胃脈沉滑因飲白酒作痢下血淡膿水腹痛小便不利裏急後重參术為君甘草滑石檳榔木香蒼术為佐下保和丸二十五丸第二日前証俱減獨小便不利以益元散與之安

治痢十法

其或惡寒發熱身首俱痛此為表証宜微汗和觧用蒼术川芎陳皮芍藥甘草生薑三片煎　其或腹痛後重小水短下積此為裏証宜和中疏氣用炒枳殼制厚朴芍藥陳皮滑石甘草煎

其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血証法當用擂末桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱加黃

其或口不渴身不熱喜熱湯熨盪是名挾寒加乾姜　其或
墜在血活之後此氣滯証宜於前藥加檳榔一枚　其或在下
則經住在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平証當認其寒則
溫之熱則清之虛則用參术補之毒解積下食自進　其或力
倦自覺氣少惡食此為挾虛証宜加白术當歸身尾甚者加人
參又十分重者止用此一條加陳皮補之虛回而利自止　其
或氣行血和積少但虛坐努責此為無血証倍用當歸身尾卻
以生芍藥生苄生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安　其或
纏墜退減十之七八穢積已盡糟粕未實當炒芍藥炒白术炙
甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有
滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸丸未宜遽用蓋固腸丸有

去濕實腸之功　其或利後糟粕未實或食粥稍多或饑甚方食腹中作痛切不可驚恐當以陳皮白术各半煎湯和之自安　其或久痢後體虛氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子皮肉豆蔻白礬半夏甚者添牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐大澁亦能作痛又甚者灸天樞氣海　右前方用厚朴專瀉滯凝之氣然厚朴性大溫而散氣久服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡則用炒枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退當去之只用陳皮以和眾藥然陳皮去白有補瀉之兼若為參术之佐亦純作補藥用　凡痢疾腸痛必以白芍藥甘草為君當歸白术為佐惡寒者加桂惡熱痛者加黃栢達者更能參以歲氣時令用藥則萬舉萬全豈在

乎其方而已哉

附脉理

脉訣舉要曰濇則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又曰無積不痢脉宜滑大浮弦急死沉細無害

附諸方

五苓散　治伏熱下痢分利陰陽

黄連香薷飲　治感暑下痢鮮血

清暑益氣湯　治暑病内傷下痢不思飲食發熱

六合湯　治伏熱煩悶或成痢疾　但是中暑

○已上數方治因暑下痢之劑

敗毒散加石連肉　治下痢熱毒不進飲食

倉廩方 仁存方 治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑致發熱者

敗毒散加陳米薑棗同煎 俱見傷風

防風芍藥湯 拔粹方 治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風　芍藥　黃芩各一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

○已上數方治痢疾身熱者之劑

香連丸 和劑方 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連 去芦二十兩用吳茱萸十兩同浸炒令赤色去茱萸不用

木香 四兩八錢不見火

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲下

導氣湯 拔粹方 治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥一兩 當歸半兩 大黃二錢半 黄連一錢

黄芩二錢半 木香 檳榔各一錢

右㕮咀每服二兩水三鍾煎至七分溫服食前

木香枳殼丸 聖惠方 治痢疾裏急後重燕開胸膈進飲食破滯氣散內熱

木香 檳榔 陳皮去白 黄連去鬚

蓬朮煨 當歸去芦 枳殼去穰炒 青皮各五錢

香附子去毛 黄栢各一兩半 黑牵牛頭末二兩

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸或七十丸姜湯下

如腫毒加服至二百丸利五七行立消

戴人木香檳榔丸　治証同前

木香　檳榔　青皮　陳皮

廣木　枳殼　黃連　黃柏

大黃各半兩　丑末　香附各一兩

右為末水丸梧子大每五六十丸煎水下量虛實與之緋珠多三稜黃芩當歸分兩不同　見鼓脹

保和丸　治脾虛因積作後重者不可下用此消導　見積聚

和中丸　同前　見調補脾胃

○已上數方治痢疾後重者之劑

黃連阿膠丸 和劑方 治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

阿膠炒二兩 黃連去鬚三兩 茯苓去皮三兩

右黃連茯苓為末水熬阿膠膏搜和丸如梧子大每三十丸米飲下

當歸丸 濟生方 治冷留腸胃下痢純白腹痛不止

當歸 芍藥 附子 白朮

乾薑 厚朴 阿膠蛤粉炒各一兩

烏梅肉二兩

右為末醋糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

蒼朮芍藥湯 拔萃方 治痢疾痛甚者

蒼朮二兩 芍藥一兩 黃芩 官桂各五錢

右㕮咀每一兩水二鍾煎至一鍾溫服

四味阿膠丸仁存方治挾熱下痢色黃煩燥多渴臍腹疼痛小便不利

黃連淨四兩 茯苓去皮二兩 赤芍藥三兩 阿膠蛤粉炒一兩

右為末醋糊丸梧子大每服五十丸米飲下

當歸導氣湯拔粹方治膿血痢無度腹中痛

當歸 芍藥各一錢 甘草一錢半 青皮七錢

槐花七分 生地黃酒洗焙乾二錢

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前如後重加木香檳榔末各三分澤瀉半錢如小便利去澤瀉

○已上數方治腹痛者之例

烏梅丸 治熱留腸胃臍腹疞痛下痢純血或服熱藥過多毒

蘊于內滲成血痢　濟生方

烏梅肉二兩　黃連三兩　當歸　枳殼去穰麸炒各二兩

右為末醋糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下

茜根丸濟生方治一切毒痢及蠱注下血如雞肝心煩腹痛

茜根洗　川升麻　犀角鎊　地榆洗

當歸去蘆洗　黃連去鬚　枳殼去穰麸炒　白芍藥各等分

右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

槐花散拔萃方治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮　槐花　荊芥穗各等分

右為末水煎空心熱服

地榆散百一選方治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢暑痢

地榆　赤芍藥　黃連　青皮

右等分為末每服三錢漿水調如無只以新水亦得若血痢水煎

地榆散　治下血遠年不瘥及血痢

地榆　卷栢各等分

右㕮咀用水沙瓶煮數十沸通口服

蘗皮湯經驗方治傷寒下痢亦治久血熱痢

蘗皮三兩　黃芩二兩　黃連一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服腹痛加山梔子小便不利加赤茯苓阿膠煎服

椿皮丸經驗方治下痢清血腹中刺痛

用椿根白皮不拘多少為末米醋糊丸如梧桐子大空心米
飲下三四十丸
四物湯保命集治下痢純血
川芎　當歸　白芍　生苄
槐花　黃連　御米殼等分
右剉水煎服
苦參丸　治血痢
用苦參不以多少炒焦為末滴水丸如梧子大每服五十丸
米飲下
治痢血方
昔曹魯公痢血百餘日國醫無能療者陳應之取盐水梅除

核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞相莊肅梁公亦痢血應之曰此挾水穀當用三物散亦數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉竈心土等分為末臘茶清調下食前服

治下痢純血經驗方

黃栢蜜炙令香黃色一兩

右為末每服三錢空心温漿水調下

一方　治血痢

用地錦草不以多少晒乾碾為細末每服二錢空心米飲調下

一方　治腸風血痢

用鯽魚一個破開去腸膽釀白礬二錢燒灰存性為末米飲調服

○巳上數方治痢疾下血者之劑

地榆散 和劑方 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤多白少或下鮮血裏急後重小便不利

地榆 炒　乾葛 各半斤　乾薑 炮二兩　當歸 去苗三兩

茯苓 去皮　赤芍藥 各六兩　甘草 炙四兩　罌粟殼 蜜炒十二兩

右爲末每服一錢用溫熟水調下不拘時服若下痢純白及紫黑血并腸滑不禁者不可服之

地榆芍藥湯 拔粹方 治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮 八兩　地榆 二兩　卷栢　芍藥 各三兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前通口服

阿膠湯 拔粹方 治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黃連炒二兩　梔子半兩　阿膠蛤粉炒　黃蘗去皮炙各一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服食前

大黃湯拔粹方治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈者用此徹利

大黃一兩

右用好酒二鍾浸半日煎至一鍾去大黃將酒分二服如未止再服以利爲度復服芍藥湯和之痢止再服芍藥黃芩湯以徹其毒也

芍藥湯拔粹方下血調氣溲而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩　當歸　黃連　黃芩各半兩

肉桂二錢半 檳榔 大黃各三錢 甘草炙

木香各二錢

右㕮咀每服半兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服如痢不減漸加大黃如汗後臟毒加黃栢半兩

芍藥黃芩湯 捘粹方 治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脈洪疾者下痢膿血稠粘

黃芩 芍藥各一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣溫服食前

芍藥蘗皮丸 捘粹方 治便膿血

芍藥 黃蘗皮等分

右為末醋糊丸如梧桐子米飲送下

專治赤痢秘方

黃連二兩　木香　甘草各二錢

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓温服食前先一日服五苓散三貼次日早服此藥即止如神

又方

用蓮白青韭一大握多要取汁和煮酒一盞温飲之極驗又治頻人心痛有效散氣行血故也

解毒金花散經驗方治下痢膿血熱毒

黃芩　白术　赤茯苓　赤芍藥各半兩

黃連　黃蘗各一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓温服食前如腹痛

加梔子仁二枚同煎

一方　治熱利不止

用車前葉擣爛取汁一鍾入蜜一合煎服

黃連烏梅丸聖惠方治濕熱痢不瘥

烏梅炒　黃連各四兩淨

右爲末煉蜜丸梧子大每服二十丸米飲下食前

芍藥蘗皮丸子和方治一切濕熱惡痢頻併窘痛無問膿血

芍藥　黃蘗各一兩　當歸　黃連各半兩

右爲末水丸小豆大溫水下三四十丸等服忌油膩生冷一切熱物

○已上數方治濕熱傷血赤痢之劑

戊巳丸 和劑方 治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹刺痛

黄連去須 吳茱萸去梗 白芍藥各三兩

右爲末麵糊丸梧子大每三十丸米飲空心下日三服

升陽除濕防風湯 拔粹方 如大便閉或裏急後重數至圊而不能便或少有白膿或少有血愼勿利之升舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮四兩米泔水治 防風三錢 白朮一錢

茯苓一錢 白芍一錢

右㕮咀每服一兩除蒼朮另作片子水一碗半煮至二盞納諸藥同煎至一盞去滓稍熱空心食前服

升陽益胃湯 治脾虛濕勝陽氣下陷作痢 見內傷類

胃風湯　治風入腸胃作痢或白或赤或豆汁　見胃風類

錢氏白朮散　治氣血俱虛神弱之人或瀉或痢或吐

人參　白茯苓　白朮　木香

甘草　藿香各一兩　乾薑半兩

右爲粗末每服五錢水一鍾煎七分食前溫服

一方　治白痢

酸石榴皮半個　草果一箇　陳皮三片　烏梅一個

甘草一寸　乾薑一塊

右㕮咀都作一服二鍾水煎至一鍾去滓食前溫服

一方　山藥剉如豆大一半瓦罐內炒熟一半生用爲細末米飲調下

○已上數方治溼熱傷氣白痢之劑

噤口痢

石蓮肉 日乾

右爲末每服二錢陳倉米調下便覺思食仍以日照東方壁土炒眞橘皮爲末薑棗畧煎佐之

一方 治噤口痢

用黃蓮半斤㕮咀生薑四兩切作片與黃蓮同炒待薑焦黃色去薑只取黃蓮爲細末同陳米飯一處搗爛丸如梧桐子大每服七八十丸赤者陳米飯下白者陳皮湯下赤白相參者陳米橘皮湯下

一方 用獨子肥皂一枚去核用鹽實其內火燒存性爲細末

先煑白米粥用少許入在粥內食之立効

一方　梨一枚去心入好蜜一匙煨過食之

○已上数方治禁口痢之劑

麯蘗丸　治食積作痢

川芎　神麯　白朮　附子各等分

右為細末麪糊丸梧子大每服三五十丸温米飲下此藥亦

治飧泄

○廣按此治冷飲食作痢熱則開散之理

木香丸　治痢疾

木香三錢　豆豉一兩洗淨　巴豆四十九粒去殼針穿灯上燒存性另研

右為末豆豉為丸菉豆大每服三丸紅痢甘草湯下白痢乾

薑湯下

木香不二丸　治痢疾或赤或白或赤白交雜

木香不見火　肉豆蔻麵裹煨　柯子煨過取肉各一錢

巴豆一兩去殼油另研　淡豆豉末一錢半一半入藥一半打糊

右為末淡豆豉末同麵打糊為丸如黄豆大小兒如菉豆大量大小虚實每服只許一丸切忌服二丸食前或臨卧冷湯下赤痢地榆湯下白痢乾薑湯下赤白交雜甘草湯下服此藥後多行二三次即住

○廣按此二方用巴豆即通因通用之理然於傷冷飲食患痢用之庶乎可也殊不知痢本因水穀停積濕而生熱濕熱為病但有傷氣傷血為白為赤之分終無寒冷之義經

曰皆是除濕熱用大黃以推蕩乃是正治也

聖餅子　治積滯作痢

黄丹二錢　定粉三錢　密陀僧二錢　舶上硫黄二錢

輕粉少許

右為細末入白麵四錢滴水和為丸指尖大捻作餅子陰乾食前漿水磨化服之大便黑色為妙

蘇感丸　治冷積作痢

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如粟大每五丸淡姜湯空心下

蘇合香丸　見中風　感應丸　見傷食

○已上數方治積滯作痢之劑

治赤白痢

吳茱萸揀淨　黃連去鬚各等分

右為一處以好酒浸透取出各自揀焙或晒乾為末糊丸如梧桐子大赤痢用黃連丸三十粒甘草湯下白痢用茱萸丸三十粒乾薑湯下赤白痢各用十五粒相合併甘草乾姜湯下

駐車丸　和劑方治一切下痢無問冷熱

阿膠搗碎蛤粉炒如珠子為末以醋四合熬成膏一兩半

黃連去鬚三兩　當歸去芦一兩半　乾薑炮一兩

右為末以阿膠膏丸如梧桐子每服三十丸食前米飲下

阿膠梅連丸　宣明方治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸証

金井阿膠淨草灰炒透明白別研細　赤茯苓

烏梅肉去核炒　赤芍藥　黃栢剉炒　黃連去鬚

乾薑炮　當歸焙各等分

右為細末入阿膠研勻水丸梧子大溫米飲下十丸食前連夜五六服小兒丸如菉豆大忌油膩脂肥諸物

三味黃丸子經驗方止諸痢

黃連八兩　枳殼四兩　黃栢四兩

右為細末麪糊為丸梧子大空心飯湯下二三十丸如要急後重加枳殼湯下

香連丸　治一切痢

黃連五兩剉　粉草二兩研碎　木香二兩不見火

右先將草連用蜜水畧拌濕安在銚中重湯薰之良久取出

晒乾再依上法薰之得九薰九爆九炒再晒十分乾與木香一處為末水糊丸梧子大每服五十丸食前酒下或米飲下

又方 治一切痢

黃連一两 枳殼 甘草炙 烏梅各半两

右㕮咀每半两水煎空心服忌魚猪肉油生冷果子

遇仙立效散 治諸惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜無度或口禁不食不問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

罌粟殼去蒂盖炒黃 當歸洗各二两 甘草

赤芍藥 酸石榴皮 地榆各一两

右㕮咀每服水一鍾半煎空心温服忌生冷油膩之物

神効參香散 和劑方治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻無問新久並能治之

白扁豆炒　人參去芦　木香各一兩　茯苓去皮

肉豆蔻煨各四兩　陳皮去白　罌粟殼去蒂各十二兩

右為末每服三大錢用温米飲下不拘時服

水煮木香丸 和劑方治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼去穰一兩八錢　青皮去白三兩四錢

甘草炙三兩　當歸去芦　訶子炮去核　木香不見火各六兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一鍾煎作至六分空心或食前服

真人養臟湯 和劑方 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦髓裏急後重臍腹疼痛或脫肛墜下酒毒便血並治之

罌粟殼 去蒂蓋蜜炙三兩六錢　人參 去芦

當歸 去芦酒洗各六錢　肉桂 去皮八錢　訶子 去核一兩二錢

木香 二兩四錢不見火　肉豆蔻 麵裹煨半兩

白朮 焙六錢　白芍藥 一兩六錢　甘草 一兩八錢不見火

右㕮咀每服四錢水一鍾煎服臟寒者加附子

一方 治一切痢

罌粟殼 蜜製　黄蘗 炙　乾薑　當歸

枳殼 去白　甘草 炙各等分

右用韮菜十數根水二鍾煎不拘時服

固腸湯 三因方治冷熱不調痢赤白

罌粟殼去蒂盖三兩醋炙　白芍藥各一兩　當歸

甘草各一兩　陳皮　訶子　白姜炮各半兩

人參　木香各三錢

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

豆蔻固腸丸 御藥方治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白

木香　赤石脂　乾姜　縮沙

厚朴姜製　肉豆蔻麫裹煨各三兩

右為末麫糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

勝金丹 秘方

乾薑　黃蠟等分

右銀石器化蠟入姜末勻，丸如芥子大每服七丸或二七丸白痢酒下赤并花水下

又方

烏梅　白梅 陳久者各七个

右件去梅核搗梅肉爛同乳香末少許丸梧子大以茶末為衣每服二十丸茶湯下食前

石榴皮散 經驗方 治暴瀉不止及痢赤白

用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下二錢

一方　治白膿痢

用白石脂為末醋糊丸如小豆大每服十丸空心米飲送下日三服

秘方痢疾方

粟殼去穰蜜炒伍錢　陳皮去白伍錢　甘草炙五錢

乳香　沒藥各二錢

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓入乳沒食前服如白痢熱服紅痢冷服如痢不止加青皮四錢煎

白朮安胃散拔萃方治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無度又治男子小腸氣痛婦人臍下虛冷并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止

茯苓去皮　白朮　車前子各一兩　五味子

烏梅各半兩　罌粟殼蜜製去二兩

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

朴連湯 經驗方 治下痢久不瘥

厚朴 姜製 黄連 等分

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓食前温服

神効丸 一名當歸丸 治休息痢膿血不止疼痛困弱

當歸 烏梅肉 黄連 等分

右為細末以生蒜汁和衆手丸如梧子大焙乾每服三十丸空心煎厚朴湯下加至五十丸一方加阿膠一方煉蜜丸甚者鎔蠟丸

一方 止休息痢

縮砂為末空心米飲下 錢

木香散 本事方 治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香　黃連各半兩 二味同炒　甘草炙一兩
罌粟殼　生薑各半兩同炒
右為末入麝香少許每服二錢米飲下
固腸丸 見婦下帶下類 即樗皮丸
至白朮黃芩湯 接粹方 服前藥痢疾雖除更宜調和
白朮一兩　黃芩七錢　甘草三錢
右㕮咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前
白朮黃耆湯 接粹方 服前藥痢疾雖除更宜服此補養
白朮一兩　黃耆七錢半　甘草三錢
右㕮咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前
機要白朮芍藥湯 服藥痢疾雖除宜用此補脾胃又治老人

奉養太過飲食傷脾特或瀉痢

白朮 白芍藥 各一兩甘芍藥補脾炒用治後重生用腹痛炒用酒浸炒尤妙 甘草 炙半兩

右剉每一兩水煎服

○已上數方治赤白諸痢虛痢久痢之劑

牛黃神金丸 宣明方 治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤白諸色或渴否或小便澁否并小兒驚癖積熱痃癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消食

輕粉 粉霜 硇砂 以上另研 雄黃 研

硃砂 信砒 巴豆 去皮各一錢

黃丹 蠟 三錢

右先研粉霜次旋入硇砂研細一下雄黃硃砂信砒再研下丹粉研勻別研巴豆爛為油與煎藥研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調桂苓甘露散或益元散亦得 俱見中暑類

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯 俱見傷寒

三一承氣湯 見濕熱

玄青丸 宣明方治下痢勢惡頻併窘痛或久愈諸藥不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜以此逐

之蕪宣利積熱消食積黃瘦中滿水腫腹脹療小兒驚癖積熱乳癖諸症泄瀉勿服

黃連　黃蘗　大黃　甘遂

芫花醋拌炒　大戟各五錢　牽牛四两取末二两

青黛一两　輕粉一錢

右為末水丸小豆大初服十丸每服加十丸空心日午臨卧各一服以利為度後常服十五二十丸數日後得食以病未全除者再加取利利後却常服以意消息病除為度隨證止之小兒丸如黍米大

○已上數方通因通用之劑

○廣按痢疾所因有二或因暑月煩渴縱食瓜果生冷肉饌

腸胃或因夜卧失被早起入水寒濕外襲肚腹二者皆令水穀不化鬱而生熱則為濕熱濕熱傷氣則成白痢濕熱傷血則成赤痢氣血俱傷則成赤白痢其証臍腹疼痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或下赤白相雜或如豆汁或如魚腦或如屋漏水裏急後重頻欲登厠日夜無度不可遽用罌粟殼龍骨肉豆蔻訶子赤石脂輩收澁病邪則淹纏而不已也其法痢疾初得一二日間元氣未虛以推逐為美失之於初五日以後脾胃已虛以消導升散為佳所用之藥不過辛苦寒凉之劑以開除濕熱鬱積行氣和血使氣血宣行而已病久挾虛又當以滋補氣血收澁滑脫其温辛熱之藥兼之則萬舉萬全而无一失

也矣　又嘗論之濕熱傷氣成白痢者宜調氣理濕為主而兼清熱濕熱傷血成赤痢者宜凉血清熱為主而兼理濕至於氣血俱傷成赤白痢者則相兼而治觀丹溪節齋之用藥可見矣

痢疾治例　出明醫雜著

王節齋曰痢是濕熱食積三者別赤白青黄黑五色以屬五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黄者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是下之下後未愈隨証調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜温年老及虛弱人不宜下

主方

黄芩炒二錢半 黄連炒一錢半 白芍藥炒二錢 ○已上三味有疾必用之藥 木香 枳殼炒各一錢半 檳榔 炙甘草三分

若腹痛加當歸一錢半縮砂一錢再加木香芍藥各五分

若後重加滑石炒一錢半再加枳殼檳榔各五分芍藥生用再加五分黄芩條實者亦加五分

若白痢加白术白茯苓炒滑石陳皮各一錢初欲下之再加大黄五錢兼食積加山查子枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎桃仁各一錢半初欲下之再加大黄五錢

若紅白相雜加當歸川芎桃仁各一錢半以理血滑石陳皮

蒼朮各一錢半以理氣有食積亦加山查枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減芩連芍藥各七分加白朮一錢半黃耆茯苓陳皮各一錢縮砂五分檳榔枳殼再加炙乾姜

若紅痢人胃弱血虛或下後未愈減芩連各五分加當歸川芎熟地黃阿膠珠陳皮各一錢白朮一錢半

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澁短少加木通澤瀉茯苓各一錢山梔子炒五分以分利之

若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花各一錢久不愈減芩連各七分去檳榔枳殼再加阿膠珠砂側栢葉各一錢半炒黑乾姜二錢白朮一錢半陳皮一錢

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼用條實黃
芩加升麻一錢以升提之

若嘔吐食不得下加軟石膏一錢半陳皮一錢山梔仁炒五
分入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白朮陳皮黃連黃
芩阿膠之類以補之而痢自止

有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾姜縮砂厚朴
肉桂之類

若得痢而誤服溫熱止澁之藥則雖稍久亦宜用前法以下
之下後方調之

若得痢便用前正法以下之而未愈又用前調理法治而久

不愈此屬虛寒而滑脱可於前虛補寒温二條擇用更加龍骨赤石脂罌粟殼烏梅肉等收澁之藥

丹溪心法附餘六卷　終

龍骨赤石脂罌粟殼烏梅肉等收澁之藥

丹溪心法附餘六卷 終